


VIGILÂNCIA ESTADUAL DAS ARBOVIROSES



PRINCIPAIS SINTOMAS		DENGUE	ZIKA	CHIKUNGUNYA
	FEBRE DURAÇÃO	>38°C 4 A 7 dias	Sem febre ou Subfebril (<38%) 1-2 dias subfebril	Febre alta > 38°C 2-3 dias
	RASH FREQUÊNCIA	Surge a partir do Quarto dia 30% a 50% dos casos	Surge no primeiro ou Segundo dia 90% a 100% dos casos	Surge 2-5 dias 50% dos casos
	MILAGIA (FREQUÊNCIA)	+++	++	+
	ARTRALGIA (FREQUÊNCIA)	+	++	+++
	INTENSIDADE DA DOR ARTICULAR	Leve	Leve/Moderada	Moderada/Intensa
	EDEMA DA ARTICULAÇÃO	Raro	Frequente e leve intensidade	Frequente e de Moderada a intensa
	CONJUNTIVITE	Raro	50% a 90% dos casos	30%
	CEFALEIA	+++	++	++
	HIPERTROFIA GANGLIONAR	+	+++	++
	DISCRASIA HEMORRÁGICA	++	Ausente	+
	RISCO DE MORTE	+++	+*	++
	ACOMETIMENTO NEUROLÓGICO	+	+++	++
	LEUCOPENIA	+++	+++	+++
	LINFOPENIA	Incomum	Incomum	Frequente
	TROMBOCITOPENIA	+++	Ausente (raro)	++

Fonte: Brito C, Rev Soc Bras Med Trop 49(5): 537-543, 2016

* Pode haver risco de morte nos casos neurológicos como a SGB decorrente da Zika ou par crianças com malformações congênitas graves.



SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

