



**ESTADO DO TOCANTINS**  
***PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ***  
***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***  
***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***  
***“Adm.: 2017/2020”***

**Plano de Contingência Contra o novo Corona vírus  
(COVID-19)  
Município de Paranã-TO**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
***PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN ***  
***SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE***  
***FUNDO MUNICIPAL DE SA DE***  
***“Adm.: 2017/2020”***

**DOCUMENTO ELABORADO POR**  
**GILL LIA MENDES RIBEIRO**  
**COORDENADORA DA ATEN O BASICA**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN **  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SA DE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

## **INTRODU AO**

Ap s a evidencias do surto do novo coronavirus (covid-19) enfrentado pelo cidade de Wuhan, prov ncia de Hubei, na China. E pela poss vel pandemia que o mundo pode enfrentar a secretaria de sa de juntamente com a coordena o da aten o b sica e gerencia hospitalar cria o plano de conting ncia contra o novo covid-19, visando   promo o e preven o de sa de deste munic pio.

Coronavirus   uma fam lia de v rus que causam infec oes respirat rias o novo agente do coronavirus foi descoberto em 31/12/19 ap s casos registrados na china. Provoca o novo coronavirus (covid-19).

Os primeiros coronavirus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, no entanto, foi em 1965 que o v rus foi descrito como coronavirus ,em decorr ncia do perfilna microscopia, parecendo uma coroa segue abaixo alguns tipos de coronavirus existente: ALPHA coronavirus 229E e NL63, BETA coronavirus OC43 e HKU1,SARS-COV (causador da s ndrome respirat ria aguda grave ou SRS),MERS-COV,SARS-COV-2 novo tipo de v rus do agente causador covid-19.

O per odo de incuba o e m dio de incuba o da infec o pelo novo Coronav rus (COVID-19)   de 5 dias, com intervalo que pode chegar at  13 dias,o Brasil possui uma rede de unidades sentinelas para vigil ncia da influenza distribu das em servi os de sa de, em todas as unidades federadas do Pa s que monitoram a circula o do v rus atrav s de casos de S ndrome Gripal (SG) e S ndrome Respirat ria Aguda Grave (SRAG) que estejam hospitalizados. Os casos que atendem a defini o de caso de S ndrome Respirat ria Aguda Grave (SRAG1) **devem ser notificados concomitantemente** no Sistema de Informa o da Vigil ncia Epidemiol gica da Gripe (SIVEP – Gripe).



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN **  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SA DE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS- CoV   em m dia de 7 dias ap s o in cio dos sintomas. No entanto, dados preliminares do novo Coronav rus (COVID-19) sugerem que a transmiss o possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

Ainda n o h  informa  es de quantos dias antes do in cio dos sinais e sintomas uma pessoa infectada pode transmitir o v rus, o manejo adequado dos casos suspeitos ou confirmado do novo Coronav rus (COVID-19) depende do reconhecimento precoce de sinais de alarme e monitoramento cont nuo.

Protocolo de Tratamento do novo Coronav rus (COVID-19):

<http://bit.ly/ProtocoloTratamentoCoronav rus>

Como toda normatiza  o, o Protocolo est  sujeito a ajustes decorrentes da sua utiliza  o pr tica e das modifica  es do cen rio epidemiol gico do novo Coronav rus (COVID-19).

**Atendimento a pessoas com suspeita de infec  o pelo novo coronav rus (COVID-19) na Aten  o Prim ria   Sa de**

**1. Identifica  o de caso suspeito:**

- Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respirat rio (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostra  o, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros).

Febre: temperatura corporal acima de 37,8  C, conforme verifica  o axilar.

- Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infec  o pelo novo coronav rus, priorizar o atendimento, ofertar m scara cir rgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circula  o de pessoas sem prote  o) sempre que poss vel.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

- São considerados casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus:

**Situação 1:** febre + pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) + histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

**Situação 2:** febre + pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) + contato próximo de caso suspeito para o novo coronavírus (2019-nCoV) nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

**Situação 3:** febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) + contato próximo de caso confirmado de novo coronavírus (2019-nCoV) em laboratório nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

## **2. Medidas de isolamento:**

- Desde o primeiro atendimento, a pessoa com suspeita de novo coronavírus deve utilizar máscara cirúrgica.
- Realizar o atendimento da pessoa com suspeita do novo coronavírus em sala privativa ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado.
- Realizar higiene adequada das mãos, respeitando os cinco momentos de higienização:
  - 1 – antes de contato com a pessoa;
  - 2 – antes da realização de procedimento;
  - 3 – após risco de exposição a fluidos biológicos;
  - 4 – após contato com a pessoa;



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

5 – após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa.

- O profissional deve usar equipamento de proteção individual (EPI): protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/ avental/ jaleco, máscara N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 $\mu$  tipo N99, N100 ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis. Para realização de outros procedimentos não geradores de aerossóis, avaliar a disponibilidade da N95 ou equivalente no serviço. Não havendo disponibilidade, é obrigatório o uso da máscara cirúrgica.

### **3. Notificação:**

- A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito.

- O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e históricos de viagens do caso suspeito).

- A SMS deve notificar imediatamente todos os casos suspeitos ao CIEVS Nacional, por meio do link <http://bit.ly/2019-ncov>, do e-mail [notifica@saude.gov.br](mailto:notifica@saude.gov.br) ou do Disque Notifica: 0800-644-6645.

- Caso a equipe na APS não consiga contato rápido com a vigilância municipal, deverá entrar em contato diretamente com CIEVS Nacional, notificando a vigilância municipal na primeira oportunidade de contato.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

#### **4. Identificação de contactantes:**

Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa;

- Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de coronavírus (2019-nCoV) devem ser acompanhados e monitorados quanto à apresentação de sinais e sintomas; e
- Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação e encaminhamento.

#### **4. Transporte:**

- Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus para a unidade de referência (definida em cada localidade – município ou estado) para monitoramento, diagnóstico e confirmação do caso;
- As pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificadas na triagem até sua chegada ao local de isolamento na unidade de referência, o que deve ocorrer o mais rápido possível;
- A equipe deve certificar-se de que as informações do caso foram repassadas oportunamente para a unidade de referência para a qual a pessoa for encaminhada;
- Todos os profissionais que estiverem envolvidos no transporte deverão utilizar máscara cirúrgica durante todo o deslocamento até chegar à unidade de referência. Se houver necessidade de realizar procedimentos, atentar para o uso dos EPI adequados;
- Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização;



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN **  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SA DE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

- Orientar poss veis acompanhantes quanto   import ncia da higieniza o das m os;
- Garantir a ventila o do ve culo para aumentar a troca de ar durante o transporte;
- Limpar e desinfetar todas as superf cies internas do ve culo ap s a realiza o do transporte. A desinfec o pode ser feita com  lcool 70%, hipoclorito de s dio ou outro desinfetante indicado para este fim, seguindo o procedimento operacional padr o definido para a atividade de limpeza e desinfec o do ve culo e seus equipamentos;
- A provis o de todos os insumos, como sab o l quido,  lcool em gel e EPI, deve ser refor ada pela institui o, bem como higienizantes para o ambiente; e
- No servi o de refer ncia, sempre que ocorrer a identifica o de caso suspeito, ser  realizada a coleta de duas amostras de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinado (nasal/oral) ou amostra de secre o respirat ria inferior (escarro, lavado traqueal ou lavado broncoalveolar). As amostras coletadas ser o encaminhadas para o laborat rio, conforme fluxo estabelecido.

**5. Medidas de controle do ambiente assistencial:**

- Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, estetosc pio aparelho para aferi o de press o arterial e term metros) devem ser limpos e desinfetados com  lcool 70% ap s o uso;
- Higienizar adequadamente as m os com frequ ncia, respeitando os cinco momentos de higieniza o;
- Utilizar EPI para evitar contato direto com fluidos corporais: protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/ avental/ jaleco, m scara padr o de seguran a N95/PFF2/N99/N100/PFF3 ou, se indispon vel, m scara cir rgica;





**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

- Fornecer máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, ou pessoa que têm ou teve contato com o caso suspeito ou confirmado, e encaminhar para uma área separada ou sala de isolamento;
- Prevenir picadas de agulha ou ferimento por objetos cortantes; gerenciamento seguro de resíduos;
- Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização);
- Realizar desinfecção de equipamentos e limpeza do ambiente com solução de hipoclorito de sódio em pisos e superfícies dos banheiros;
- Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Anvisa; e
- A SMS deve compartilhar com as equipes que atuam na APS dados epidemiológicos sobre a circulação do vírus corona e outros vírus respiratórios, bem como orientar os profissionais sobre as medidas de controle e a condução dos casos suspeitos.

**7. Medidas de prevenção populacional:**

- Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso;
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;
- Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de atendimento para casos suspeitos da doença;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e
- Manter os ambientes bem ventilados.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN **  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SA DE**  
**“Adm.: 2017/2020”**

**8. Registro no Sistema de Informa o da Aten o Prim ria (e-SUS AB):**

- Registrar o atendimento no Sistema de Informa o (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – Diagn stico de doen a respirat ria aguda pelo 2019-nCoV para registro de casos.

**9. Materiais necess rios para medidas de preven o e controle:**

- M scara padr o de seguran a N95/PFF2/N99/N100/ PFF3;
- M scara cir rgica;
- Protetor ocular ou protetor de face;
- Luvas;
- Capote/ avental/ jaleco;
- Sab o l quido;
-  lcool em gel;
-  lcool 70%;
- Higienizantes para o ambiente;
- Saco para descarte de res duo contaminado.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

## **10. Assistência hospitalar**

### **Cuidados com o paciente**

- Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos (precaução padrão, por contato e gotículas).
- Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível.
- Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco (5) momentos de higienização (consultar tópico – Informações detalhadas).
- Imediatamente antes da entrada no quarto, devem ser disponibilizadas condições para a higienização das mãos: dispensador de preparação alcoólica;
- Lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido;
- Suporte para papel toalha abastecido, lixeira com tampa e abertura sem contato manual;
- Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. Se necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o transporte;
- Qualquer pessoa que entrar no quarto de isolamento, ou entrar em contato com o caso suspeito, deve utilizar EPI (preferencial máscara N-95, nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização;)



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

- Eventualmente utilizar máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco;
- Protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental;
- Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à importância da higienização das mãos;
- A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel e EPI, deve ser reforçada pela instituição bem como, higienizantes para o ambiente.

## **11. Medidas de isolamento**

- O paciente deve ser mantido em isolamento respiratório em quarto privativo;
- O quarto deve ter a entrada sinalizada com um alerta referindo para doença respiratória (gotículas) com a finalidade de limitar a entrada de pacientes, visitantes e profissionais que estejam trabalhando em outros locais do hospital;
- O acesso deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no atendimento do indivíduo no serviço de saúde.

## **12. Transporte do paciente**

Cuidados com o paciente:

- Manter o paciente isolado precocemente paciente suspeito durante o transporte;



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN **  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SA DE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

- Os pacientes suspeitos devem utilizar m scara cir rgica desde o momento em que forem identificados na triagem at  sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais r pido poss vel;
- Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI (preferencial m scara n95, nas exposi es por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aeroliza o);
- Eventualmente m scara cir rgica em exposi es eventuais de baixo risco; (protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental);
- Realizar higiene de m os respeitando os cinco momentos de higieniza o;
- Orientar poss veis acompanhantes quanto   import ncia da higieniza o das m os;
- A provis o de todos os insumos como sab o l quido,  lcool gel, EPI devem ser refor ados pela institui o, bem como higienizantes para o ambiente.

### **13. Assist ncia hospitalar**

#### **Cuidados com o paciente:**

##### **13.1 Recep o**

Minimizar ao m ximo o tempo de perman ncia de casos suspeitos na recep o da unidade hospitalar

##### **a) Caso suspeito**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN **  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SA DE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

- Acolher o paciente;
- Isolar precocemente com precau o padr o (m scara).

**b) Classifica o de risco**

- Realizar a classifica o de risco ou triagem, investigando o hist rico de viagens internacionais entre os pacientes que apresentem sintomas de doen a respirat ria ou contato com indiv duos com suspeita;
- Orientar e fornecer ao paciente a m scara cir rgica que dever  ser utilizada durante toda a sua perman ncia no hospital;
- Todo o paciente que seja considerado caso suspeito, deve receber prioridade no atendimento sendo conduzida a unidade de isolamento.

**c) Primeiro atendimento**

**M dico:**

- Investigar os sinais e sintomas apresentados;
- Definir necessidade de hospitaliza o, contra refer ncia e ou tratamento domiciliar;
- Realizar Manejo Cl nico.

**Equipe Multiprofissional:**

- Em caso de necessidade de transfer ncia contactar com o N cleo Interno de Regula o (NIR) para que seja regulado o leito/enfermaria;
- Fazer imediatamente contato com o CIEVS/URR/NVEH, conforme a recomenda o da Secretaria Estadual de Sa de (SES).
- Pra a dos Girass is, Esplanada das Secretarias, S/N Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007 Tel.: +55 63 3218-1700 saude.to.gov.br



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

- Seguir as orientações de transporte para os indivíduos que necessitem e se enquadrem na definição de caso em monitoramento ou suspeito que forem encaminhados ao hospital de referência, conforme orientação.

**d) Unidade de internação**

- Durante a sua permanência no Hospital, acomodá-lo na unidade de isolamento, evitar o trânsito e a permanência desnecessária de pessoas no local, garantir a privacidade do indivíduo e orientar o uso constante de máscara cirúrgica descartável. Não se recomenda a presença de acompanhantes ou visitantes para esses pacientes;
- Sinalizar o quarto com alerta referindo para doença respiratória, a fim de limitar a entrada de pacientes, visitantes e profissionais que estejam trabalhando em outros locais do hospital. (O acesso deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no atendimento do indivíduo no serviço de saúde);
- Todos os profissionais envolvidos com o atendimento ao paciente devem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI): máscara N95 (nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização), máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco, capote de manga longa e luvas de procedimento, gorro descartável e óculos;
- Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco (5) momentos de higienização (consultar tópico – Informações detalhadas);
- Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento;



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

- Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à importância da higienização das mãos e utilização de EPI's;
- Preencher a Ficha de Investigação para os casos suspeitos do novo Coronavírus (COVID-19) (<http://bit.ly/COVID-19>).

#### **14. TRANSPORTE**

- Os profissionais envolvidos no transporte devem adotar as medidas de precaução, inclusive com a utilização de EPI's.
- Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte. Quando possível usar veículos com compartimentos separados para o motorista e o paciente.
- Proceder à limpeza e desinfecção das superfícies que entrar em contato com o paciente durante o transporte. Por exemplo, se o paciente foi transportado em ambulância, as partes internas do veículo devem ser limpas com água e sabão e desinfetadas utilizando-se desinfetantes como álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1%.

##### **14.1 ENCAMINHAMENTO**

Os pacientes que se enquadram nos critérios de definição de caso suspeito deverão ser conduzidos de acordo com o que segue:

**Casos Leves:** indivíduo que apresentar quadro de síndrome gripal (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia) com febre baixa (37,5 – 37,8°C) sem sinais de gravidade, sem desconforto respiratório e sem exacerbação de doenças de base. Esses casos poderão ser acompanhados pela equipe de





**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN **  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SA DE**  
*“Adm.: 2017/2020”*

sa de (isolamento domiciliar) ou qualquer outra unidade hospitalar de porte I e II.

**Casos Moderados:** indiv duo que apresentar s ndrome gripal (tosse, dor de garganta, mialgia, cefaleia) com febre moderada (37,9 – 38,5 C), hipotens o (PA sist lica <90mmHg e diast lica <60mmHg) com desconforto respirat rio e podendo apresentar sinais de exacerba o de doen as de base. Esses casos poder o ser acompanhados nas unidades hospitalares porte II e III.

**Casos Graves:** indiv duo que apresentar s ndrome gripal (tosse produtiva, dor de garganta, mialgia, cefaleia) com febre alta (> 38,5 C), taquicardia, 34 redu o da diurese, evoluindo com desconforto respirat rio, batimento de asas do nariz, redu o da satura o de O<sub>2</sub> (< 95%) e/ou exacerba o de doen as de base.

Esses pacientes devem ser atendidos na unidade de refer ncia para atendimento dos casos suspeitos – Hospital Geral de Palmas - HGP.

Nos casos suspeitos em crian as, observar persist ncia ou retorno da febre, presen a de sibilos, irritabilidade/choro, rebaixamento do n vel de consci ncia, redu o da diurese (<400ml em 24hs), tiragem intercostal.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
***PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN ***  
***SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE***  
***FUNDO MUNICIPAL DE SA DE***  
***“Adm.: 2017/2020”***

**Referencias**

1. Plano de conting ncia do Tocantins novo coronav rus (covid-19)
2. Brasil Site do minist rio da Sa de
3. POP Protocolo Operacional Padr o (Atendimento a pessoas com suspeita de infec  o pelo novo coronav rus)