O QUE É ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA - APLV



A APLV é uma reação alérgica do organismo a proteína que faz parte do leite.

Essa reação pode aparecer em crianças de 0 a 2 anos de idade:

• Introdução do leite de vaca na alimentação de forma precoce.

Como é feito o diagnóstico?

Retirar o leite de vaca da alimentação da criança e da mãe que estiver amamentando.



Testes clínicos com acompanhamento do médico especialista.

Quais os sinais e sintomas?

- Vômitos;
- Palidez;
- Cólica;
- Sangue nas fezes;
- Dermatite (pele irritada);
- Déficit de crescimento;
- Regurgitação.



Qual o tratamento?

Crianças amamentadas: mãe deve retirar da sua alimentação o leite de vaca e seus derivados, e manter o aleitamento materno.



Alimentação complementar sem leite e derivados.

Dieta substitutiva com fórmulas nutricionais para APLV para as crianças que necessitarem.

Fórmulas nutricionais

São disponibilizadas pelo SUS.

Pela Assistência Farmacêutica do Estado.

Por meio de laudo médico, laudo nutricional e laudo social.





©2023 GOVERNO DO TOCANTINS

©Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total dessa obra, desde que citada a fonte que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

Elaboração, edição, distribuição e informações SECRETARIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Assistência Farmacêutica

Núcleo de Nutrição

E-mail: dafalimentato@gmail.com

Telefone: 3218-1745 / 3091

Endereço: Quadra 104 norte, avenida LO-4, conj. 4,

lote 46 - Assistência Farmacêutica. - Palmas/TO. Cep.:

77.006-032

Supervisão: Milena Alves de Carvalho Costa -Nutricionista do Núcleo de Nutrição da Assistência Farmacêutica

Renata Andrade de Medeiros Moreira - Professora do curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins (UFT)

Elaboração: Clara Oliveira Lopes e

Laís Fernanda Costa Oliveira

- Integrantes do grupo de pesquisa: Promoção e Educação em Saúde do Curso de Nutrição da UFT